

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos

Nombre comercial Poli High Plus
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 1, 4, 20, 50, 100, 200 y 1000 L

Oligosacáridos	15.00 %
Polisacáridos	20.00 %
Diluyente	65.00 %
Total	100%

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Polinizador Orgánico

Uso foliar


Clasificación Especialidades

Presentaciones comerciales: 1, 4, 20, 50, 100, 200 y 1000 L

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido color morado
Pureza: 99.9%
Punto de ebullición: 130-138° C
Impurezas: 0.001% máx.
Solubilidad: 100% soluble en agua
pH: 5.90 a 6.25
Densidad: 1.32 g/mL
Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Poli High Plus es un producto innovador único en el mercado, diseñado exclusivamente para incrementar la polinización por abejas y abejorros en forma natural. Poli high plus es un polinizador y atrayente agrícola de origen 100% orgánico, el cual fue desarrollado biotecnológicamente para ser utilizado en todo tipo de cultivos, para incrementar la polinización y amarre de flores y frutos de manera natural.

EFFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Por medio del atrayente natural que contiene, estimula la llegada exclusivamente de abejas y/o abejorros a las flores del cultivo para llevar a cabo la fecundación.

Aumenta la polinización en forma natural.

Aumenta la producción y calidad de frutos.

CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis L/ha	Época de aplicación
Tomate, Chile, Bell peper y Tomatillo	1.0	Desde prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Sandía, Melón, Pepino y Calabaza	1.0	Desde prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 10 o 15 días.
Fresa, Zarzamora, Arándanos y Frambuesa	1.0	Desde prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 10 o 15 días.
Aguacate	1.0	Desde prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Durazno, Pera, Mango, Ciruelo, Piña Guayaba y Manzana	1.0	Desde prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Vid y Uva de mesa	1.0	En prefloración y al inicio de la brotación. Aplicaciones cada 10 o 15 días
Limón persa, Naranja, Limón Mexicano y Limón Italiano	1.0	En prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 25 o 30 días.
Algodón	1.0	En prefloración y durante la floración. Realizar aplicaciones cada 20 o 25 días.
Chía	1.0	Inicio de floración y en fructificación. Realizar aplicaciones cada 20 días
Chile habanero y Chile manzano	1.0	En prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 10 o 20 días.
Berenjena	1.0	En prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Cabocha	1.0	En prefloración y floración. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.